



ESTACIÓN DE AVISOS DEL BIERZO

AVISO DE RIESGO DE BLACK-ROT Y MILDIU EN VID

Se mantiene el riesgo de infección de mildiu y black rot, debido al tiempo previsto para los próximos días, de tormentas y lluvias para el fin de semana.

La vid está empezando a florecer en todos los viñedos del Bierzo. Es un estado fenológico muy sensible a los ataques de ambos hongos. Los racimos que se infecten en este estado de floración y cuajado, se necrosan y se pierden.

Se recuerda que el tratamiento más eficaz en este momento es el tratamiento preventivo, que se da antes de que se produzca la infección, impidiendo la entrada de éstos hongos en la planta.

Los productos fungicidas de contacto son eficaces en la prevención (si se aplicaron antes de las lluvias). Pero deben reaplicarse cuando hayan sido lavados por precipitaciones superiores a 15 litros por metro cuadrado, siempre que se mantengan las condiciones de riesgo de infección.



Figura 1: Racimo de uva infectado de black rot en 2020

BLACK ROT (Fungicidas autorizados)

Ametoctradin+metiram
Azoxistrobin
Difenoconazol
Folpet
Kresoxim-metil
Mefentrifluconazol
Tebuconazol

Carracedelo, 24 de mayo de 2023