




SEGUIMIENTO DE LA CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) y OTRAS INCIDENCIAS EN LA D.O.P. VALLES DE BENAVENTE – AÑO 2024.

Se remite la fenología, la curva de vuelo media de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) y otras consideraciones en las parcelas de seguimiento instaladas por la Estación de Avisos Agrícolas de Toro (Granja Florencia) del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora.

El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo se inició con la instalación de las trampas el día 20 de marzo de 2024. El vuelo de la segunda generación de polilla está iniciándose, muy condicionado por las condiciones meteorológicas, no se observan glomérulos formados por las larvas en los racimos.


Curvas de vuelo polilla del racimo Valles de Benavente 2024:



p/t/d – polilla trampa día



Curva de vuelo media polilla del racimo Valles de Benavente 2024:



p/t/d – polilla trampa día

Otras consideraciones:

- Yesca

Se observan plantas que presentan síntomas en hoja de yesca. Se aconseja marcar estas cepas para que en la época de poda tomar las precauciones pertinente como la desinfección del instrumental para evitar su propagación, la eliminación de los restos de poda, el arranque de la cepa afectada para eliminar foco de enfermedad, ...



- Eutipiosis Se continúa observando plantas con síntomas de este **hongo de madera**, presentando un desarrollo raquíptico, con malformaciones y necrosidades en las hojas. Se aconseja marcar estas cepas para que en la época de poda tomar las precauciones pertinentes como la desinfección del instrumental para evitar su propagación, la eliminación de los restos de poda, el arranque de la cepa afectada para eliminar foco de enfermedad, ...





- **Oídio (*Erysiphe necator*)**

Se observan algunos órganos vegetativos afectados por oídio, sobre todo en hoja y base de pámpano.

Las materias activas recomendadas son varias, bien penetrantes o de contacto, (triazoles, estrobilurinas, azufre, ...) y se pueden consultar en la página web el Boletín de Avisos Fitosanitarios de la Rioja nº8 <https://www.larioja.org/agricultura/es/publicaciones/boletin-avisos-fitosanitarios-2024>



Oídio en pámpano, hojas y racimo.

Parcelas, fenología y polilla-trampa-día:

FECHA	Granucillo - Cunqueilla								Benavente			
	E-14 / Granucillo/Cunqueilla - Prieto picudo				E-15 / Granucillo/Cunqueilla - Tempranillo				E-18 / Benavente - Tempranillo			
	Capturas p/t/d	Fenología			Capturas p/t/d	Fenología			Capturas p/t/d	Fenología		
	At	Fr	Av		At	Fr	Av		At	Fr	Av	
20/03/2024	puestas	A	A	A	puestas	A	A	A	puestas	A	A	A
26/03/2024	0,0	A	A	C en vara	0,0	A	A	C en vara	0,0	A	A	C en vara
04/04/2024	0,0	A	A-B	C en vara	0,0	A	B	C en vara	0,0	A	B	D en vara
11/04/2024	0,0	A	B	C en vara	0,0	B	B-C	C en vara	0,0	B	C	E en vara
18/04/2024	0,0	C	D	E	0,0	D	E	E	0,4	D	E	F
24/04/2024	0,0	D	E	F	0,1	E	F	F	0,2	E	F	G
02/05/2024	0,0	E	F	F	0,0	E	F	F	0,4	E	G	G
09/05/2024	0,4	F	F	G	0,0	F	F	G	0,4	F	G	G
16/05/2024	0,5	G	G	G	0,0	G	G	G	0,4	G	G	G
23/05/2024	0,1	G	G	G	0,0	G	G	G	0,1	G	G	H
30/05/2024	0,2	H	H	H	0,3	H	H	H	0,1	H	H	H
06/06/2024	0,1	H	H	H	0,1	H	H	H	0,1	H	H	I
13/06/2024	0,3	H	I	I	0,1	H	I	I	0,0	H	I	I
20/06/2024	0,4	I	I-J	J	0,0	I	J	J	0,0	I	J	J
28/06/2024	0,2	J	J	K	0,0	J	J	K	0,0	J	J	K

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado.



Cuadrado o cuadro de capuchines
florales (Estado J)



Grano tamaño guisante (Estado K)



Localización aproximada de las parcelas de seguimiento:

