

SEGUIMIENTO VIÑEDO EN LA D.O.P. VALLES DE BENAVENTE (Zamora) FENOLOGÍA, CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) y OTRAS INCIDENCIAS – AÑO 2025.


Se remite la fenología, la curva de vuelo media de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) y otras consideraciones en las parcelas de seguimiento instaladas por la Estación de Avisos Agrícolas de Toro (Granja Florencia) del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora.

El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo se inició con la instalación de las trampas el día 25 de marzo de 2025.


1.- Polilla del racimo (*Lobesia botrana*).

Continúa el vuelo de la primera generación de adultos condicionada por la meteorología.

Curvas de vuelo polilla del racimo Valles de Benavente (Zamora) 2025.




Curva de vuelo media polilla del racimo Valles de Benavente (Zamora) 2025.



2.- Conchudos (*Tropinota* y *Oxythyrea*).

Se observan adultos, pero no daños sobre órganos vegetativos presentes.



3.- Oídio (*Erysiphe necator*)

En aquellas parcelas que en breve van a tener, o ya los tienen, brotes o pámpanos de más de 10 cm (estado fenológico G – racimos separados) y, que en años anteriores han tenido presencia de oídio, se recomienda realizar un tratamiento preventivo para poder controlar futuras infecciones que puedan afectar al racimo en su fase de crecimiento.

Las materias activas recomendadas son varias, bien penetrantes o de contacto, (triazoles, estrobilurinas, azufre, ...) y se pueden consultar en la página web el Boletín de Avisos Fitosanitarios de la Rioja nº 10 <https://www.larioja.org/agricultura/es/publicaciones/boletin-avisos-fitosanitarios-2025>

4.- Alteraciones abióticas.

Las bajas temperaturas que ha habido desde finales de abril y en la primera quincena de mayo están provocando en las plantas una ralentización en el desarrollo vegetativo y una falta de la coloración verde característica del momento fenológico en que se encuentra, predominando coloración amarilla, además de pequeños daños en sumidades, hojas crispadas, con roturas o con los bordes quemados por el frío.



Parcelas, fenología y polilla-trampa-día:

	Granucillo - Cunqueilla								Benavente			
	E-14 / Granucillo/Cunqueilla - Prieto picudo				E-15 / Granucillo/Cunqueilla - Tempranillo				E-18 / Benavente - Tempranillo			
	Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Capturas	Fenología		
FECHA	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av
25/03/2024	puestas	0,0	A	B1	puestas	0,0	A	B1	puestas	0,0	A	B1
03/04/2025	0,0	0,0	B1	0,0	0,0	0,0	B1	0,0	0,0	0,0	B1	B
08/04/2025	0,0	0,0	B	0,0	0,0	0,0	B	0,0	0,0	0,0	B	0,0
24/04/2025	0,0	B	C	D	0,0	B	C	D	0,0	D	D	E
29/04/2025	0,1	C	D	E	0,0	D	E	F	0,4	E	F	F
08/05/2025	0,0	E	F	F	0,1	F	F	G	0,6	F	G	G
14/05/2025	0,3	F	G	G	0,0	F	G	G	0,3	G	G	G

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado.

*Racimos visibles
(Estado F)*



*Racimos separados
(Estado G)*





Localización aproximada de las parcelas de seguimiento:

