

SEGUIMIENTO VIÑEDO EN LA D.O. ARRIBES (Zamora) FENOLOGÍA, CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) y OTRAS INCIDENCIAS – AÑO 2025.


Se remite la fenología, la curva de vuelo media de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) y otras consideraciones en las parcelas de seguimiento instaladas por la Estación de Avisos Agrícolas de Toro (Granja Florencia) del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora.

El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo se inició con la instalación de las trampas el día 21 de marzo de 2025.

1.- Polilla del racimo (*Lobesia botrana*).


El vuelo de la primera generación de adultos va declinando.

Curvas de vuelo polilla del racimo Arribes (Zamora) 2025:



p/t/d – polilla trampa día

Curva de vuelo media polilla del racimo Arribes (Zamora) 2025:



2.- Acariosis (*Calepitrimerus vitis*).

Presencia de acariosis en hoja de variedades tintas, si las condiciones climáticas lo permiten, el uso de azufre en polvo para controlar el oídio tiene efecto acaricida para poder controlar estos focos.



3.- Oídio (*Erysiphe necator*)

En plena floración-cierna (I) y dónde es recurrente su presencia, es recomendable prevenir que no se desarrolle.

Las materias activas recomendadas son varias, bien penetrantes o de contacto, (triazoles, estrobilurinas, azufre, ...) y se pueden consultar en la página web el Boletín de Avisos Fitosanitarios de la Rioja nº 10 <https://www.larioja.org/agricultura/es/publicaciones/boletin-avisos-fitosanitarios-2025>

4.- Eutipiosis

Se observan plantas con los primeros síntomas de este **hongo de madera**, presentando un desarrollo raquíptico, con malformaciones y necrosidades en las hojas. Se aconseja marcar estas cepas para que en la época de poda tomar las precauciones pertinentes como la desinfección del instrumental para evitar su propagación, la eliminación de los restos de poda



2.- Parcelas, fenología y polilla-trampa-día:

FECHA	Mámoles - Fariza				Fermoselle							
	E-16 / Mámoles				E-17/ Fermoselle - El Piornal				E-19/ Fermoselle - El Campo			
	Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Capturas	Fenología		
	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av
21/03/2025	puestas	0,0	A	0,0	puestas	0,0	A	0,0	puestas	0,0	A	0,0
27/03/2025	0,0	0,0	B1-lloros	0,0	0,0	0,0	B1-lloros	0,0	0,0	0,0	B1-lloros	0,0
01/04/2025	0,0	0,0	B1-lloros	B	0,0	0,0	B1-lloros	B	0,0	0,0	B1-lloros	B
09/04/2025	0,0	0,0	B	C	0,1	B	B	C	0,1	B	C	D
15/04/2025	0,1	B	B	C	0,1	C	D	E	0,0	C	D	D
25/04/2025	0,0	C	C	D	0,0	D	E	F	0,0	D	E	E
06/05/2025	0,2	E	F	G	0,4	F	G	G	0,8	E	F	G
12/05/2025	0,1	F	G	G	0,2	G	G	G	0,3	G	G	G
20/05/2025	0,0	G	G	H	0,1	G	G	H	0,1	G	G	H
28/05/2025	0,0	H	H	H	0,3	H	H	H	0,1	H	H	H
06/06/2025	0,0	H	H	H	0,1	H	H	I	0,1	H	I	I
12/06/2025	0,0	I	I	I	0,1	I	I	I	0,0	I	I	J

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado.



Localización aproximada de las parcelas de seguimiento:

