

SEGUIMIENTO VIÑEDO EN LA D.O. ARribES (Zamora) FENOLOGÍA, CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) y OTRAS INCIDENCIAS – AÑO 2025.


Se remite la fenología, la curva de vuelo media de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) y otras consideraciones en las parcelas de seguimiento instaladas por la Estación de Avisos Agrícolas de Toro (Granja Florencia) del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora.

El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo se inició con la instalación de las trampas el día 21 de marzo de 2025.

1.- Polilla del racimo (*Lobesia botrana*).


El vuelo de la segunda generación de adultos continúa, no igual en todas las parcelas. No se observan focos sobre las bayas.

Curvas de vuelo polilla del racimo Arribes (Zamora) 2025:





Curva de vuelo media polilla del racimo Arribes (Zamora) 2025:




Productos indicados para el control de polilla del racimo:

En la siguiente tabla y gráfico se presentan las materias activas y los momentos más adecuados para realizar los tratamientos, si fuera necesario, según la estrategia de control/tratamiento elegida.

Materia activa	Nombre y casa comercial
Tratamiento insecticida entre inicio de puesta e inicio de eclosión de huevos:	
clorantulaniliprol	pr. común
Tratamiento insecticida a inicio de eclosión de huevos:	
<i>Bacillus thuringiensis</i> *	pr. común
ciantraniliprol	Exirel – FMC
spinosad*	pr. común
tebufenocide	Mimic – Certis Belchim
Tratamiento con feromona líquida (confusión sexual):	
feromona líquida*	Subvert – Suterra; Explovo Vit – Syngenta

* Materias activas permitidas en producción ecológica.

Fuente: Boletín de Avisos Fitosanitarios de La Rioja.



Fuente: Boletín de Avisos Fitosanitarios de La Rioja.

2.- Acariosis (*Calepitrimerus vitis*).

Presencia de acariosis en hoja de variedades tintas, si las condiciones climáticas lo permiten, el uso de azufre en polvo para controlar el oidio tiene efecto acaricida para poder controlar estos focos.



3.- Erinosis (*Colomerus vitis*).

Son visibles los síntomas, agallas hacia el haz de las hojas, en plantas concretas, sin que se observe que haya una intensidad y extensión grandes.



4.- Oídio (*Erysiphe necator*)

Dónde es recurrente su presencia, es recomendable prevenir que no se desarrolle.

Las materias activas recomendadas son varias, bien penetrantes o de contacto, (triazoles, estrobilurinas, azufre, ...) y se pueden consultar en la página web el Boletín de Avisos Fitosanitarios de la Rioja nº 10 <https://www.larioja.org/agricultura/es/publicaciones/boletin-avisos-fitosanitarios-2025>



5.- Yesca


Se continúa observando plantas con síntomas de **Eutipiosis – hongos de madera**, y se ven también síntomas en hoja de **Yesca**. Se aconseja marcar estas cepas para que en la época de poda tomar las precauciones pertinentes como la desinfección del instrumental para evitar su propagación, la eliminación de los restos de poda, el arranque de la cepa afectada para eliminar foco de enfermedad, ...



6.- Parcelas, fenología y polilla-trampa-día:

	Mámoles - Fariza				Fermoselle							
	E-16 / Mámoles				E-17/ Fermoselle - El Piornal				E-19/ Fermoselle - El Campo			
	Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Capturas	Fenología		
FECHA	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av
21/03/2025	puestas	0,0	A	0,0	puestas	0,0	A	0,0	puestas	0,0	A	0,0
27/03/2025	0,0	0,0	B1-llosos	0,0	0,0	0,0	B1-llosos	0,0	0,0	0,0	B1-llosos	0,0
01/04/2025	0,0	0,0	B1-llosos	B	0,0	0,0	B1-llosos	B	0,0	0,0	B1-llosos	B
09/04/2025	0,0	0,0	B	C	0,1	B	B	C	0,1	B	C	D
15/04/2025	0,1	B	B	C	0,1	C	D	E	0,0	C	D	D
25/04/2025	0,0	C	C	D	0,0	D	E	F	0,0	D	E	E
06/05/2025	0,2	E	F	G	0,4	F	G	G	0,8	E	F	G
12/05/2025	0,1	F	G	G	0,2	G	G	G	0,3	G	G	G
20/05/2025	0,0	G	G	H	0,1	G	G	H	0,1	G	G	H
28/05/2025	0,0	H	H	H	0,3	H	H	H	0,1	H	H	H
06/06/2025	0,0	H	H	H	0,1	H	H	I	0,1	H	I	I
12/06/2025	0,0	I	I	I	0,1	I	I	I	0,0	I	I	J
25/06/2025	0,0	J	K	K	0,2	J	K	K	1,0	J	K	K
02/07/2025	0,0	K	L	L	1,0	K	L	L	1,4	K	L	L
08/07/2025	0,0	L	L	L	1,1	L	L	L	1,7	L	L	L
17/07/2025	0,0	L	L	L	0,3	L	L	L	0,4	L	L	L

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado.



Cerramiento del racimo (Estado L)

Localización aproximada de las parcelas de seguimiento:

