




SEGUIMIENTO DE LA CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) Y FENOLOGÍA DE LA VID EN EL BIERZO - 2025

El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) se inició con la instalación de las trampas el día 26 de marzo de 2025. Este seguimiento se realiza en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.


Nota: Capturas p/t/d: polilla/trampa/día

Curvas de vuelo de la polilla del racimo en El Bierzo:





Curvas de vuelo media de la polilla del racimo en El Bierzo:



Parcelas, fenología y polilla/trampa/día en vid en El Bierzo:

	Rimor				Camponaraya							Villafranca				Campo				San Andrés de Montejos			
			Godello				Mencia		Malvasía					Doña Blanca				Mencia				Mencia	
	Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Fenología			Capturas	Fenología			Capturas	Fenología			Capturas	Fenología		
FECHA	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av
03/04/2025	0,1	B2	B2	C	0,2	B2	B2	B2	B2	B2	C	0,0	C	D	E	0,0	B2	B2	C	0,1	B2	B2	B2
10/04/2025	0,3	D	D	E	0,2	C	C	D	D	E	E	0,2	E	Fr	F	0,1	D	D	E	0,1	C	C	D
16/04/2025	1,3	E	E	F	0,5	E	F	F	D	E	F	0,2	F	F	G	0,4	E	E	E	0,4	E	E	F
25/04/2025	1,6	F	F	G	1,2	F	F	G	E	E	F	0,3	G	G	G	1,8	F	F	G	0,4	E	F	F
30/04/2025	0,5	F	G	G	1,3	F	G	G	F	F	G	0,6	G	G	H	0,9	F	G	G	0,7	G	G	H
07/05/2025	0,3	H	H	H	0,6	G	G	G	G	G	G	0,0	G	H	H	0,4	H	H	H	0,3	H	H	H
14/05/2025	0,1	H	H	H	0,0	H	H	H	H	H	H	0,1	H	H	H	0,1	H	H	H	0,1	H	H	H
21/05/2025	0,0	H	H	H	0,6	H	H	H	H	H	H	0,0	H	H	H	0,2	H	H	H	0,4	H	H	H
28/05/2025	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H	H	H	H	0,0	H	H	I ₁	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H
04/06/2025	0,1	H	H	I1								0,0	H	I1	I2	0,0	H	I1	I2	0,1	H	I1	I2



Junta de Castilla y León

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Delegación Territorial de León
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Sección Sanidad y Producción Vegetal
Estación de Avisos Agrícolas

FECHA	Arganza				Iglesia del Campo				Parandones				Valtuille de Arriba			
	Mencia				Mencia				Mencia				Mencia			
	Fenología				Fenología				Fenología				Fenología			
	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av	p/t/d	At	Fr	Av
03/04/2025	0,1	B2	C	C	0,8	C	C	D	1,5	C	C	D	0,1	C	C	C
10/04/2025	0,1	B2	C	D	1,6	C	D	D	5,2	D	D	E	0,1	C	D	D
16/04/2025	0,1	D	D	E	1,6	D	E	E	7,8	D	E	F	1,2	D	D	E
25/04/2025																
30/04/2025	0,6	F	G	G	13,5	G	G	H	10,7	G	H	H	2,9	G	G	H
07/05/2025	0,0	G	H	H	1,0	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H
14/05/2025	0,0	H	H	H	0,3	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H
21/05/2025	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H	0,1	H	H	H	0,0	H	H	H
28/05/2025	0,0	H	H	H	0,1	H	H	H	0,0	H	H	I ₁	0,1	H	H	H
04/06/2025	0,0	H	H	I ₁	0,0	I ₁	I ₂	I ₂	0,0	I ₁	I ₂	I ₂	0,0	I ₁	I ₂	I ₂

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado



Estados fenológicos de la vid:



Yema de invierno (estado A)



Yema de algodón (estado B)



Punta verde (estado C)



Salida de las hojas (estado D)



Hojas extendidas (estado E)



Racimos visibles (estado F)



Racimos separados (estado G)



Racimos florales separados (estado H)



Junta de Castilla y León

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Delegación Territorial de León
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Sección Sanidad y Producción Vegetal
Estación de Avisos Agrícolas




Floración o cierna (estado I)




Cuajado (estado J)



Grano tamaño guisante



Inicio envero



Maduración



Caída de hojas