




## SEGUIMIENTO DE LA CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) Y FENOLOGÍA DE LA VID EN EL BIERZO - 2025

El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) se inició con la instalación de las trampas el día 26 de marzo de 2025. Este seguimiento se realiza en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.


Nota: Capturas p/t/d: polilla/trampa/día

### Curvas de vuelo de la polilla del racimo en El Bierzo:





**Curvas de vuelo media de la polilla del racimo en El Bierzo:**







# Junta de Castilla y León

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Delegación Territorial de León  
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería  
Sección Sanidad y Producción Vegetal  
Estación de Avisos Agrícolas

FECHA	Arganza				Iglesia del Campo				Parandones				Valtuille de Arriba			
	Capturas	Mencía			Capturas	Mencía			Capturas	Mencía			Capturas	Mencía		
		Fenología	At	Fr		Av	Fenología	At		Fr	Av	Fenología		At	Fr	Av
03/04/2025	0,1	B2	C	C	0,8	C	C	D	1,5	C	C	D	0,1	C	C	C
10/04/2025	0,1	B2	C	D	1,6	C	D	D	5,2	D	D	E	0,1	C	D	D
16/04/2025	0,1	D	D	E	1,6	D	E	E	7,8	D	E	F	1,2	D	D	E
25/04/2025	0,2				4,7				4,4				0,9			
30/04/2025	0,2	F	G	G	5,1	G	G	H	2,7	G	H	H	1,2	G	G	H
07/05/2025	0,0	G	H	H	1,0	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H
14/05/2025	0,0	H	H	H	0,3	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H
21/05/2025	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H	0,1	H	H	H	0,0	H	H	H
28/05/2025	0,0	H	H	H	0,1	H	H	H	0,0	H	H	I <sub>1</sub>	0,1	H	H	H
04/06/2025	0,0	H	H	I1	0,0	I1	I2	I2	0,0	I1	I2	I2	0,0	I1	I2	I2
12/06/2025	0,0	I2	I2	I2	0,0	I2	I2	J	0,4	I2	I2	J	0,1	I2	I2	J
18/06/2025	0,3	J	K	K	0,5	K	K	K	8,9	K	K	K	6,2	K	K	K
25/06/2025	0,2	K	K	K	2,3	K	L	L	3,0	K	L	L	3,2	K	L	L
03/07/2025	0,6	L	L	L	4,5	L	L	L	0,9	L	L	L	4,8	L	L	L
10/07/2025	0,2	L	L	L	0,9	L	L	L	0,1	L	L	L	4,0	L	L	L
18/07/2025	0,1	L	L	L	0,0	L	L	M1	0,0	L	L	M1	1,1	L	L	L

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado



**Estados fenológicos de la vid:**



Yema de invierno (estado A)



Yema de algodón (estado B)



Punta verde (estado C)



Salida de las hojas (estado D)



Hojas extendidas (estado E)



Racimos visibles (estado F)



Racimos separados (estado G)



Racimos florales separados (estado H)



# Junta de Castilla y León

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Delegación Territorial de León  
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería  
Sección Sanidad y Producción Vegetal  
Estación de Avisos Agrícolas



Floración o cierna (estado I)




Cuajado (estado J)



Grano tamaño guisante



Inicio envero



Maduración



Caída de hojas