



ESTACIÓN DE AVISOS DEL BIERZO

AVISO DE VUELO DEL BARRENO DE LOS FRUTALES

El barreno o [carpocapsa](#) (*Cydia pomonella* L.) es un lepidóptero cuya larva hace galerías en el interior del fruto de manzanos y perales. Este mismo insecto es el que produce el agusanado de las nogales.

La estación de avisos hace un seguimiento de la evolución de esta plaga, mediante trampas de feromonas y en la actualidad hay vuelo de la población de adultos de la primera generación de este año. Estos adultos realizarán las puestas de huevos de los que nacen las larvas que posteriormente barrenan los frutos. Por lo tanto, es el momento adecuado para dar un tratamiento contra esta plaga, en aquellas parcelas que **no** hayan instalado lucha por confusión sexual.

Las materias activas recomendadas ahora son: bacillus thuringiensis, clorantraniliprol, emamectina benzoato, spinosad, tebufenocida, virus de la granulosis. Estas materias son más respetuosas con los enemigos naturales de las plagas. Actúan más específicamente sobre las larvas recién emergidas de los huevos, eliminándolas antes de que barrenen la fruta.

El bacillus thuringiensis y el virus de la granulosis están autorizados en agricultura ecológica.



Manzana en crecimiento con daños de Barreno

Carracedelo, 22 de abril de 2026