
SEPTORIA EN CEREALES

Hongos *Zymoseptoria tritici* y *Parastogonospora nodorum* (sinónimos *de Septoria tritici* y *Septoria nodorum* respectivamente)

Sintomatología: Zonas irregulares con manchas cloróticas que tienden a alargarse, tornando posteriormente a pardas, normalmente con un halo amarillento, comenzando de forma habitual, pero no forzosamente, por las hojas más bajas. Las manchas crecen, coalescen entre ellas y se necrosan, formando manchas secas en las que se aprecian, no siempre con claridad, unos puntitos (picnidios) de color miel a negruzco (dependiendo de la especie)












SEPTORIA EN CEREALES

CULTIVOS CONSIDERADOS

TRIGO.

VIGILANCIA

- ✓ **Qué:** Manchas cloróticas y necrosis en las hojas.
- ✓ **Cuando:** Durante todo el cultivo, desde la germinación hasta el inicio de la maduración del grano.
- ✓ **Cómo:** Revisar cuidadosamente todas las hojas, haz y envés, con especial atención a la presencia de los picnidios que diferencian la septoria de otras afecciones.

CRITERIO MONITORIZACIÓN

0. Asintomático
1. < 25 % de las plantas con manchas sin afectar a las tres hojas superiores
2. > 25 % de las plantas manchas sin afectar a las tres hojas superiores
3. < 25% plantas con manchas afectando a las tres hojas superiores
4. > 25% plantas con manchas afectando a las tres hojas superiores

FICHA TÉCNICA DE APOYO

Disponible en:

https://plagas.itacyl.es/septoriatrigo

FOTOGRAFÍAS

F.J. Ciudad-Bautista y Área de Plagas (ITACYL), libre distribución.

Documento elaborado dentro del proyecto:

Tecnología y digitalización al servicio de la monitorización y predicción de plagas agrícolas en Castilla y León (Acrónimo: DIGIPLAGRI)

Intervención CyL 7162 del Programa Estratégico de la PAC 2023-2027, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Nº exp. 006