

CÓMO IDENTIFICAR LA PRESENCIA DE TOPILLO CAMPESINO

ASPECTO EXTERIOR DE LAS HURAS

- Habita en madrigueras que excava en el suelo. Su aspecto exterior es variable: desde una o dos bocas (3 a 6 cm de diámetro), a varias decenas cubriendo amplias superficies.
- Es habitual observar en la superficie una red de caminillos que comunican unas bocas con otras y con las zonas donde exploran en busca de alimento. Las bocas suelen estar abiertas. Si están tapadas por montículos de tierra es muy probable que no se trate de topillo campesino.



Colonia típica de topillo campesino



Colonia de topillo mediterráneo

INDICIOS DE ACTIVIDAD

- Las formas más sencillas para evaluar si las huras están activas son:
 - Por indicios de actividad: presencia en las bocas de excrementos, acumulación de restos vegetales frescos o evidencias de excavación reciente (tierra suelta y desmenuzada). Las bocas sucias o la presencia de telarañas son síntoma de inactividad.
 - Tapando las bocas con un montón de tierra o provocando su derrumbe y revisando 24 o 48 horas más tarde si han sido destapadas.



Indicios de topillo campesino: excrementos, acumulación de materia vegetal fresca, excavación reciente

CONSIDERACIONES A LOS INDICIOS DE ACTIVIDAD

- ☑ La visualización tanto de huras como de indicios puede ser dificultosa con vegetación densa.
- ☑ Algunos factores como las lluvias pueden "borrar" estos indicios.
- ☑ Otras especies, como ratones o musarañas, pueden utilizar colonias abandonadas de topillo, generando indicios muy similares.
- ☑ En casos de duda, pueden utilizarse otros métodos:
 - Extracción mediante inundación con ayuda de un depósito móvil y una manguera.
 - Uso de trampas (puede ser necesario permiso de captura).



Tapado y destapado de huras, extracción por inundación y uso de trampas

OTRAS ESPECIES



*Diferentes, pero...
¡¡Pueden dejar
indicios similares!!*


Topillo
mediterráneo



Ratones



Musaraña



Topillo campesino